



## NOUTATI de la Agentia UE pentru droguri, Lisabona

---

### PESTE 500 000 DE EUROPENI BENEFICIAZĂ ACUM DE TRATAMENT DE SUBSTITUȚIE Serviciile de tratament împotriva dependenței de opiacee au cunoscut o creștere importantă, dar disponibilitatea serviciilor este neuniformă

(24.11.2005 LISABONA) Numărul total al clienților care beneficiază de tratament de substituție în Europa a depășit pragul de 500.000, a declarat astăzi **Agentia UE pentru droguri (OEDT)** în **Raportul anual pe 2005 privind situația drogurilor în Europa**, lansat la Bruxelles.

Agentia declară că după o creștere de șapte ori în ultimii 10 ani, cel puțin 530.000 de clienți beneficiază acum de tratament de substituție în 28 de țări diferite (**cele 25 de țări membre UE, Norvegia, Bulgaria și România**), atât în centrele specializate de tratament cât prin intermediul medicilor generaliști. Se estimează că mai mult de un sfert până la jumătate dintre persoanele dependente de opiacee în Europa beneficiază în prezent de acest tip de tratament.

Și totuși, conform raportului, disponibilitatea tratamentului de substituție în Europa diferă încă semnificativ de la zonă la zonă, mai ales între **cele 15 State Membre vechi** ale Uniunii Europene, **în noile țări membre UE și în țările candidate**. Conform datelor publicate astăzi, în **cele 10 noi State Membre și în Bulgaria și România** numărul clienților care beneficiază de tratament de substituție reprezintă numai 1% din numărul total înregistrat în Europa.

Tratamentul de substituție s-a dovedit eficient în ameliorarea sănătății persoanelor cu probleme cauzate de abuzul de opiacee. De asemenea, acesta poate juca un rol important în reducerea răspândirii HIV. Raportul subliniază că inexistența posibilității de tratament în unele **State Membre** reprezintă un „motiv real de îngrijorare”.

#### Buprenorfina – o opțiune terapeutică din ce în ce mai frecventă

Metadona este medicamentul prescris cel mai frecvent în Europa în tratamentul dependenței de opiacee, pentru aproximativ 80% dintre cei aflați în tratament de substituție (și pentru 90% dintre cei internați în centre de tratament specializate). Totuși, raportul prezentat astăzi consemnează o mai mare gamă de opțiuni terapeutice în ultimii ani, ajutându-i pe medici să răspundă mai bine nevoilor pacienților.

Axându-se în special pe buprenorfină, **OEDT** informează că în prezent această substanță este utilizată în terapia de substituție în 18 țări din 28, reprezentând o opțiune terapeutică frecventă încă de la mijlocul anilor 1990. Astăzi, aproape 20% dintre clienții tratamentului de substituție beneficiază de buprenorfină <sup>(1)</sup>, cu toate că utilizarea acesteia variază considerabil de la o țară la alta.

În **Republica Cehă, Franța, Finlanda și Suedia**, de exemplu, peste 60% dintre clienții aflați în tratament de substituție au primit buprenorfină în anul 2003, deși în alte țări utilizarea acesteia rămâne modestă sau foarte limitată.

Până la sfârșitul anului 2004, toate cele **15 state membre vechi ale UE** au consemnat utilizarea buprenorfinei în tratament fie în substituția consumului de opiacee pe termen lung, fie în cazurile de sevraj în urma abuzului

de opiacee. Printre **cele 10 state membre noi ale UE**, tratamentul cu buprenorfină este uzual numai în **Republica Cehă** (vezi mai sus), unde în prezent numărul clienților care beneficiază de acest tratament este mai mare decât al celor tratați cu metadonă.

### Potențialul de abuz

În raport, se explică faptul că datorită acțiunii farmacologice și efectelor sale, buprenorfina nu este un drog foarte căutat pe piața ilicită. Și totuși, ea poate deveni un drog de abuz, iar unele țări au raportat deja că este folosită și în alte scopuri decât terapeutice.

Combinată cu alte substanțe, precum alcoolul, benzodiazepinele, barbituricele și tranchilizantele, buprenorfina poate produce interacțiuni grave, inclusiv supradoză. Totuși, decesele survenite în urma consumului de buprenorfină sunt foarte rare și datorită faptului că aceasta este tolerată de organism în doze mari.

Abuzul și deturnarea au fost raportate acolo unde buprenorfina este folosită frecvent în scop terapeutic (ex. **Franța, Finlanda**) sau unde accesul la acest drog se face cu ușurință, pe baza rețetelor eliberate de doctori sau în farmacii. Referindu-se la acest aspect, raportul subliniază nevoia adoptării unor „*măsuri de reducere a deturnării și abuzului*” de buprenorfină.

### Tratamentul pentru alte probleme legate de droguri rămâne limitat

**OEDT** atrage astăzi atenția că în ciuda extinderii tratamentului de substituție împotriva dependenței de opiacee, tratamentul pentru alte tipuri de consum de droguri rămâne limitat.

„Alternativele generale de tratament pentru cei care abuzează de cocaină sunt insuficient dezvoltate”, menționează raportul și se constată absența „unei baze solide de dovezi în Europa care să orienteze intervențiile terapeutice din acest domeniu”.

Numai câteva state – **Danemarca, Germania, Grecia, Franța, Olanda, Austria, și Suedia** – oferă servicii specializate consumatorilor problematici de cannabis, în ciuda cererii crescute de tratament împotriva abuzului de acest drog. În general, acest tip de alternative specializate de tratament sunt subdezvoltate în Europa, iar nevoile consumatorilor problematici de cannabis nu sunt pe deplin înțelese.

În comentariul său asupra rezultatelor, **directorul OEDT, Wolfgang Götz**, declară: „În ultimii 10 ani am asistat la o creștere considerabilă în Europa a ofertei de tratament de substituție pentru dependenții de opiacee. Apreciem pozitiv această realizare, dar trebuie să recunoaștem că este necesar ca investițiile în acest domeniu să continue. Nu putem uita că țelul nostru general este să asigurăm alternative de tratament *tuturor* celor care au nevoie de ele, indiferent de proveniența lor sau de drogul pe care îl consumă”.

---

### Notă

Pentru mai multe informații privind *Raportul anual* pe 2005 și toate documentele aferente, vezi <http://annualreport.emcdda.eu.int>

(<sup>1</sup>) Vezi Tema selectată – Buprenorfina: tratament, abuz și practici de prescriere, Figura 4.